

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIP 2 1 1-10-07036096

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 33 du 9 octobre 2007 - 1 page

Actualités

Stades

CEREALES: 1 à 2 feuilles pour les premiers semis.

COLZA: les parcelles les plus avancées atteingnent 6 à 10 feuilles. Les dernières pluies ont permis une nouvelle vague de levées, y compris sur des semis de fin août.

Ravageurs céréales

Avec les conditions chaudes et ensoleillées (après les brumes matinales) rencontrées depuis quelques jours, on note une activité des pucerons et cicadelles, vecteurs de viroses. Les infestations des parcelles déjà levées sont toutefois hétérogènes selon l'exposition de la parcelle. Exemples dans notre réseau ce lundi :

Touquin (77) - parcelle de plaine 4% pieds avec pucerons et 6 cicadelles piégées. Saint Jean les Deux Jumeaux (77) - parcelle en coteau vallée de la Marne - proximité bois 10% pieds avec pucerons et 90 cicadelles pié-

Surveillez attentivement les parcelles levées. Pour les pucerons, intervenir dès le seuil de 10% de plantes porteuses, ou si maintien de petites populations 8-10 jours. Pour les cicadelles, l'observation visuelle n'est pas pertinente. Seul du piégeage (fonds englués ou cuvette) permet de déterminer la présence.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÈCHE Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la

Forêt
Service Régional de la
Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire

94516 RUNGIS cedex Tel: 01-41-73-48-00 Fax: 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON lle de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis Directeur gérant : N. THERRE

Publication périodique C.P.P.A.P n°0909 B 07113 ISSN n°0767-5542

Tarifs individuels 2007: 80 euros (papier) 72 euros (fax) 66 euros (mail)

Ravageurs colza

Des dégâts importants de mulots sont signalés dans différents secteurs. Présence de chenilles défoliatrices (tenthrède, teigne, noctuelle) dans quelques parcelles du Seine et Marne, sur 5% des plantes au plus. Apparition des premières galeries de mineuse, notamment dans le centre Seine et Marne.

Pour les pucerons verts, on a des évolutions variables par rapport à la semaine dernière : diminution des infestations (avec ou sans traitement), stabilité (quelque soit le niveau initial), augmentation. Les infestations les plus fortes (>30% pieds touchés) se rencontrent cettesemaine essentiellement sur l'ensemble de la Seine et Marne.

On note également la présence de quelques

4° Jo
48744

colonies de pucerons cendrés dans le nord Seine et Marne (Iverny, Varreddes, Saint Jean les Deux Jumeaux), et en limite Essonne - Yvelines (Janvry, Bullion, Saint Martin de Brethencourt..). Il s'agit souventde secteurs où des fortes infestations ont été relevées ce printemps.

Le vol de **grosses altises** reste soutenu. Les captures cumulées atteignent des valeurs de 30 à 90 dans quelques secteurs :

- centre Seine et Marne (Crisenoy, Touquin),

- sud (Sonchamp, Boinville) et ouest des Yvelines (Bazainville, Mondreville),

-proximité Roissy (Marly la Ville-95, Iverny-77).

Le vol de charançon du bourgeon terminal est encore modéré. Des insectes n'ont été piégés, en petite quantité, que sur les sites de :

-Chailly en Brie, Château Landon, Crisenoy, Fontaine le port, Iverny, Jaulnes, Poigny, Touquin, Varreddes (77),

- Brueil en Vexin, Neauphle le Vieux, Sonchamp (78),

- Ballancourt, Lisses (91)

Rappel dégâts altises - charançon

Grosses altises

Ponte dans le sol, à proximité des collets. La larve pénètre dans les pétioles pour s'alimenter. Exceptionnellement (attaque précoce, forte population), elles peuvent aller miner le coeur des plantes.

Charançon du bourgeon terminal

Ponte dans les pétioles (limitée si températures élevées). Les larves passent du pétiole au coeur de la plante, où elles peuvent détruire le bourgeon tant que la plante n'a pas démarré son élongation. Celà entraîne le développement de tiges secondaires, et le colza prend un aspect buissonnant.

La nuisibilté de ces ravageurs reste occasionnelle.

Les parcelles les moins avancées (majorité de pieds à moins de 6 feuilles) restent à surveiller visà-vis des pucerons.

Maladies colza

Evolution rapide de la fréquence d'oïdium dans les parcelles du sud Seine et Marne touchées déjà la semaine dernière. Apparition dans les secteurs de Guignes (77) et La Ferté Allais (91).

Premières macules de **phoma** sur des plantes au stade 6-8 feuilles.

Céréales Vigilance pucerons

P162